

Risiko Schlaganfall



Prävention statt Rehabilitation

Allein durch die folgenden vier Maßnahmen kann jeder sein Schlaganfallrisiko drastisch verringern:

- *Strengste Behandlung von Bluthochdruck*
- *Rauchverzicht*
- *Antikoagulation (Blutverdünnung) bei Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörung)*
- *Normalisierung des Körpergewichts*

Informieren Sie sich am **Samstag, 28. Oktober 2017** von **10.00 – 17.00 Uhr** in den **Schloß Arkaden** Heidenheim. Wir beraten Sie zu Ihrem persönlichen Risikoprofil mit kostenloser Blutdruckmessung, Blutzuckerbestimmung, Feststellung des Gefäßstatus mit der Dopplersonographie.

Risiko Schlaganfall

Wenn Sie eines dieser Symptome bemerken – auch nur vorübergehend:

- *Akut einsetzende Lähmung eines Arms, eines Beins oder einer Gesichtshälfte*
- *Gefühlsstörungen im Gesicht, auf einer Körperhälfte*
- *Sehstörungen, Doppelbilder*
- *Sprach-/Sprachverständnisstörungen*
- *Stärkste Kopfschmerzen*

Verlieren Sie keine Zeit!

Rufen Sie ☎ 112

Sie wissen ja: time is brain


klinikumheidenheim

Klinik für Neurologie

Chefarzt Dr. Karl-Heinz Huber-Hartmann

Station C45 – Schlaganfallstation – Stroke Unit

Telefon 07321 33-91 410